出版務求信用有切實保證 又名社會醫藥常識報 主持者有學識經驗及人格

古今名醫驗案

清代名醫 金子久先生驗案

二十二方　熱起于湧泉、追及于勞宮、有汗則衰、無汗則盛、食入之頃、脘腹依然滿痕、熱來之際、巔頂尙覺眩暈、痲痒未平、胸膺更劇、痛如針刺、痒若蟲行、氣分猶有餘邪、血絡尙多風熱、自汗雖少、盜汗仍多、脈象弦虛、左部偏大、舌苔薄膩、中央淡光、治宜養液存津、參入化風淸血、

西洋參　首烏　元參　芥荊　忍冬
石斛　寬麥冬　白芍　池菊　茅根
谷牙　子芩

二十三方　手足心熱、固屬陰虧、頭目眩暈、無非陽亢、陰虧生熱、陽亢化風、風熱入營、蒸騰爲痙、得食徒增腹脹、不食微覺脘嘈、寤寐欠安、屬陰陽之不濟、曲池瘦楚、乃經絡之失舒、滋陰潛陽、不容稍緩、熄風淸熱、尤未可删、

青蒿露代水煎藥

介紹內科小兒科專家 尤學周醫士

尤學周醫士。任康健報編輯有年。大作傳誦一時。其關於性病各稿。尤爲讀者所欽佩。又得已故名醫朱少坡先生眞傳。於虛勞及小兒各病。頗有經驗。現設診所於北山西路泰安里五十八號。同人等特爲介紹。俾病家問津有途。

介紹者楊志一 朱振聲 仝啓

幸福之門

腫脹

（汕頭陳克道君問）

身體羸弱、面色黃而不甚亮、脈象虛濇、臍下及左脇下結塊甚大、堅如鐵石、雖重按亦不覺痛、大便數日一次而乾枯、小便短、色如米泔、（或如豆漿）其人困倦喜涼、兩手瘦弱特甚、上午覺無何痛苦、至下午則於腹部不結塊處微脹、兩足腫、惟結塊處、則始終頑而不知所苦、前嘗西醫注射、服西藥不見效、而增劇、又服生草藥及藥散、承云瀉有白細虫甚多、惟結積如故、經請中醫多人、亦不見效、及前月延余診、擬以和中丸服二劑不效、再診服太無神功散、（見醫學心悟積聚門）加青皮莪朮川朴紅花、服後腹痛、約三時許則瀉大便一次、糞氣非常腥臭色赤而黑、幷有白細虫很多、此方計服四劑、大便與第一劑同、再服三劑、則腹不痛、而糞黃無細虫矣、然堅積如故、惟精神略爽、下午腹脹減半、足腫稍消、症象如此、請示治法、

答陳克道君問

（楊志一）

據所述症狀而論。乃屬肝旺脾弱。中樞不運。氣滯血瘀。虫積凝聚所致。治擬疎肝理氣。健脾殺虫。參以祛瘀導滯之品。是否有當。尙希明正。

銀州柴胡一錢　大腹皮三錢
炙烏梅五分　生白朮二錢
靑陳皮各錢半　川楝子二錢
赤白芍各錢半　炒枳實錢半
使君肉三錢　當歸尾三錢
製小朴一錢　陳鶴虱錢半
五積散三錢（包煎）
陳葫蘆瓢四錢

楊志一醫士 朱振聲醫士 診例

（甲）特號二元　隨到隨診
（乙）門診一元　貧病減半
（丙）出診四元　路遠遞加
（丁）膏丸方四元　[illegible]取件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話六三四九三

掛號處啟

本報之筆

本報特聘羅家衛律師爲法律顧問

幸福三日刊

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

幸福報

鈕儀署

第二四七期

（民國十九年八月廿一日）

每份售洋二分

館址上海三馬路雲南路口

定報價目　每三日出一張五個月一元全年二元寄費在內本外埠一律國外加倍郵票代現九五計值

廣告價目　每期每格（共計五方寸）五元均排於新聞之旁如嵌入新聞中長期面議

本期要目

△讀青年病後（三）
△問病新章
△霍亂須知
△經驗良方
△夏令衛生法
△婦人乳巖症之實驗一席話
△咳嗽之種種
△止呃法
△古今名醫驗案（續）
△幸福之門

問病新章

（一）近接讀者問病函件。日多一日。幾使本報同人。無從答覆。故自本期起。另印問病紙一種。分送定戶。如非用此紙詢問者。概不答覆。

（二）此種問病紙。每定戶各發一張。請勿隨意亂用。如再欲索取。每張收費半元。

（三）非本報定戶。而欲訊問疾病者。亦須用此種問病紙。可預先向本館購買。本埠每張半元。外埠每張一元。以示限制。

讀『青年病』後（三）

尤學周

可怕　寶貴的青年時代爲病魔剝奪蹂躪

（四）最怕是淋濁

遺精過多。並不可怕。最怕者爲淋濁。淋與濁。普通人以爲二症。實則非也。淋爲初期現象。濁則爲第二期現象。舊所謂五淋。並不限於青年。青年亦不一定患此症。此處所謂淋濁。乃專指白濁而言。白濁初起。尿道微癢。龜頭覺熱。放尿之際。灼熱疼痛。尿意頻數而不能暢下。繼則黏液之分泌增加。自尿道口流出。其狀如膿。或白色。或黃色。或綠色。夜間往往陰莖勃起。發劇痛。不能安眠。此時以通利小便爲主。則病毒隨小便俱去。如瞿麥海金砂。萹蓄。川萆薢。豬苓。車前子等。若失治或治不得法。小便亦漸能自利。痛亦漸減。惟病毒不去。盤踞愈深。成爲慢性白濁。操勞則發。經年累月。不能斷根。受苦不淺。除善自調理。增加本身抵抗力。使病毒自然消滅外。實無第二法可想。近日新出之西藥如阿梯共及過去之油鉑蛋白銀類時行之電類光類療法。亦並無顯明功用。甚矣治療之難也。本病傳染於婦女。則爲頑固之白帶。與男子同一徵象。其危險則尤甚。

□霍亂須知

吳少雲

預防　病從口入、飲食先宜講求。無問河水井水。皆要清晨取用。蓋經夜露。毒氣沈消。食品更當素潔。不可隔宿。不可雜投。

急救　初見吐瀉。宜用鮮扁豆葉數十片。絞自然汁。約一酒杯。和陰陽水飲之。或加小明礬塊。約重五六分。但不可化開。恐澀口難下耳。

慎針　凡病皆可放針。何霍亂獨不可也。蓋若輩多不知針耳。與其誤針。不如不針。慎之可。

分治　凡病皆有虛實寒熱。霍亂爲尤也。虛宜補。實宜瀉。寒宜溫。熱宜清。盡人皆知。若吐瀉數次。即渴思冷飲不休。身青黑。舌絳乾。瓜枯目陷。氣促聲嘶。純是沙毒爲患。竟有人斷爲寒症。亦偵其矣。譬如一疋布。浸于水中。幾時得化。投之火內。立見成灰。卒中卒死者。爲火毒無疑。

善後　如病解後。務必少說話。多養神。食粳米稀粥。十分保養。乃可復元。

□經驗良方

□產後陰戶破碎之治法

陸文表

婦人臨產之時。兒自陰戶而下。陰戶未免損傷。或因產時艱難。穩婆動用手術。不愼而致破碎。及至產後。輕則紅腫疼痛。甚則腐爛流脂。遷延不治。苦楚莫名。僕居鄉間。每聞村嫗傳述。對於此病。有一簡易外治法。留心探聽。果屢試無不驗。誠奇方也。爲特錄之於下。俾女同胞之遭此疾苦者。得以治療焉。

(配合及用法。)以蚌殼煨成灰。研極細末。和入冰片少許。摻於患處。或用菜油及麻油調搽。均能奏效。

□小兒耳中流濃之治法

何嘉濟

小兒有因啼哭太過。眼淚入耳。或沐浴不慎。水流耳中。日而月之。遂患耳中流濃。淋漓不止。腥臭異常。甚則耳聾不聞。醫治頗難見效。今得一簡便方法。用陳廣皮一錢。燒灰存性研末。和入梅片少許。取胡桃油調勻。滴入耳內。立見功效。屢試屢驗。幸勿輕視。

□免除脚跟起泡方

凌霞彩

若行遠路。足跟易於起泡。宜用蘿蔔子炒研末。和白礬末。鋪於鞋底。即行遠路。决不起泡。便可免此痛苦矣。

□夏令衛生法 (十九)(王庚)

夏令是各種傳染病最盛行之時，所以到處有病人，即到處有受其傳染之患。因此不得不時時刻刻的留意。凡有可疑之點，務必不和他直接接觸。家中如有病人，須看其病之經重，酌量送入醫院，以救病人生命，並保護健康者的生命。

夏令中還有一個很大的危險，即命無知無識者挑痧是也。常人稍覺身體不很適意，即名之曰痧，以針挑之，放其汚血，以爲可告全愈。實則最爲危險。他所用的針，針尖上不知有幾千萬的傳染病菌，其病本不甚緊要，可以自愈的　但是因爲他的針一挑，將無數的病源體放入體血，而成爲重症不可救藥者不知多少！作者敢斷言曰；因病而挑痧；因挑痧而治愈，乃是他的萬幸，不過他若不挑，治愈上一定要比不挑爲早。因爲不挑，可以將抵抗挑痧所入的病菌之力，用在恢復自己的身體上！總之因挑痧而治愈病，世界上是沒有這回事！。夏令的天氣，容易使人疲倦，俗語上有『夏日炎炎正好眠』一句，正是形容一班人疲倦的狀態。因此無論何人，在夏季應注意有規則的生活，夜深賭博，入游戲場，最有害於身心，使身體抵抗力減少，誘起各種疾病，不可不謹。夏令對於房事，最好停止，不得已則不得不有節制。

(全篇完)

張少波 醫家

診例

科目	內科　外科　女科　喉科
診金	門診一元　出診四元
時間	上午門診　下午出診
診所	滬西武定路祥興里

□婦人乳巖證之實驗一席話

吳承忠

父執胡君。開設茶棧於北蘇州路之德安里。予時相過從。一昨聆其婦人乳岩證之實驗一席話。頗有紀載之價值。特錄出以告世之患斯疾者。俾知所擇焉。

胡君夫人。在鄉患乳間結核。如棋子大。時有隱隱一針之痛。蓋乳岩之初期也。就診於某中醫。曰。無紅無熱。陰證也。投以陽和湯。兩目暴腫而結核如故。乃置不治。及來滬上。結核寖長如鷄蛋大矣。且硬甚。胡君有友金某者。自言其夫人亦患斯症。曾入某西醫院。行開割之術。並去其腋下之核。剜其左臂股皮。以填補其乳際。雖覺微痛，而一星期出院矣。以是勸胡夫人亦就及某醫院，胡君心終懷疑。自憶少時。耳後亦患結核。多方求治不得愈。因以生薑切片。敷其上。用艾絨灸之而獲效。但不可圖速功。私念部位雖不同。而結核則一。且中國醫藉。乳岩亦重灸法。因與夫人約曰。余自爲爾治。一年以爲期。期過。聽爾開割可也。乃常以薑艾艾絨。如前法遍灸之。及痛不可忍。始去艾。初毫末之效。及三月。灸時覺癢。核稍軟。五月流出黑黃水甚多。核覺全消而愈矣。然金夫人以第一年三月間開割。至第二年三月病復作。較舊患處稍偏。且痛甚。久則週身筋脈牽引。人憊縮如猴。痛苦難以名狀。金某見狀愴絕。爲之百計求醫。又用按摩術。欲以減少其痛苦。並日服滋養品。至第三年三月間而亡。所費近萬金。而金某商業。亦因之不振。深悔從前開割之非計。胡君談時。意頗自得。以未盲從開割。引爲生平快事之一云。

予聞竟。作而起曰。中西醫之各有所長也。中西醫有溝通之必要也。人嘗言。西醫擅外科。中醫長內術。以是證觀之。又豈其然。蓋西醫器械雖精。手術雖工。不能揣其本也。近日西醫余君。將中醫一筆抹煞。謂欲溝通中西。是猶强黃白進化之種。以與南非土人。臺灣生番。調和其知識。認爲必不可能之事。嗚呼。何其不思之甚也。夫尺有所短。寸有所長。他山之石。可以攻玉。豈宜存入主出奴之見哉。余君目空一切。徒以科學萬能等名詞。以駭世炫俗。不知醫者目的。在能愈病而止。故竹頭木屑。其對證有時效且過於人參馬寶。非必高深莫測也。至中醫之能否愈病。自有數千年之歷史在。又予親見戚友中之一病而並受中西醫治者。其變化效驗。歷歷可尋。相須相成之處甚多。容當次第錄出。以與世之虛心好學者。一商榷焉。

□內傷咳嗽之種種 (上)

(楊志一)

內傷咳嗽。乃與外感咳嗽對待而言。外感咳嗽。至淺至輕。治以疎散。病無不愈。內傷咳嗽。至深至重。苟不速治。即易成癆。咳嗽既以外感爲輕。內傷爲重。爰舍外感而言內傷。

□遺精咳嗽

遺精是腎病。咳嗽是肺病。二症幷作。最易成癆。蓋腎水耗傷。肺失水蔭。猶之草木。無雨露之灌溉。有不枯萎者乎。故治療之法。以治腎爲主。治肺爲副。欲求腎肺雙治。效力兼有者。惟八仙長壽丸。最爲合宜。余嘗用之。均獲奇效。屢見一般時醫。對此等症不求正本清源之治。但用杏貝套藥。以敷衍病家。誤人實甚。

□咯血咳嗽

余嘗言曰。肺癆無不見咳嗽。咳嗽未必盡肺癆。惟視其兼見之證如何耳。如咳嗽而兼咯血。即有成癆之可能性。以故咯血實居於重要地位。豈可專事治肺止咳而已乎。按咳嗽固由肺氣之不降。咯血固由肺絡之損傷。然肺氣所以不降。肺絡所以損傷者。則責之肝火擾犯使然也。故必於咳嗽咯血之外。兼見胸膺悶痛。氣急頭眩等症。治法宜重用白芍、丹皮、黛蛤散、生石决、以平肝。茜草炭。側柏炭以止血。旋覆花、參三七、以祛瘀。桑叶，蔞皮、以肅肺。肝火不升。肺氣下降。咳嗽咯血。未有不止者。

(未完)

止呃法

—樹—人—

偶然呃逆。可用紙撚通鼻取嚏。其呃自止。或以熱湯。驟然嚥下。亦止。